

診療上の情報公開文書

実施内容	電氣的除細動・カルディオバージョンの実施に伴うラボナル注の使用について
対象患者	電氣的除細動・カルディオバージョンを実施する患者
診療科	全診療科
対象期間	承認後からマニュアル内容の見直しの必要性が生じるまで
目的・概要	<p>鎮静薬であるラボナル注は、電氣的除細動・カルディオバージョンを実施する際の疼痛を回避する為に使用されます。</p> <p>電氣的除細動・カルディオバージョンのようなごく短時間で終わる処置では速やかな効果発現と体内からの消失が見込める為、選択される薬剤の中でも頻度の高い薬剤として報告されています。</p> <p>ラボナル注は、短時間作用型に分類され、速やかに鎮静効果が得られ、電氣的除細動・カルディオバージョンを迅速に行うことができます。</p> <p>投与終了後、短時間で覚醒します。</p>
予想される不利益と対策	<p>投与後数分以内に呼吸抑制を来すことがあります。</p> <p>必要に応じ酸素投与・気道確保を行います。</p> <p>まれにショック(0.1%未満)、アナフィラキシー（頻度不明）を発生する場合があります。</p> <p>上記の徴候がみられた際には遅滞なく必要な処置を行います。</p>
問い合わせ先	社会福祉法人康和会 久我山病院 診療科担当医師 電話：03-3309-1111（代表）

作成日 2025年1月31日